

BerbereX[®] Wound Cleanser

Informações de uso do produto clínico e do paciente

O BerbereX[®] Wound Cleanser ajuda a proteger a pele e ajuda na cicatrização de pequenos cortes, arranhões, queimaduras e feridas, incluindo úlceras de pressão, úlceras diabéticas, pele e lábios rachados.

O BerbereX[®] Wound Cleanser é um anti-séptico tópico que ajuda a diminuir o risco de infecções da pele.

O BerbereX[®] Wound Cleanser é uma solução tópica para uso externo. É uma combinação de dois ingredientes ativos: cloreto de benzetônio e alantoína que foram diluídos. O Benzethonium Chloride, o ingrediente ativo do BerbereX[®] Wound Cleanser, é um antisséptico tópico que mata a maioria das formas de bactérias. A alantoína, segundo ingrediente ativo, protege a pele e promove a saúde da pele.

Como usar o BerbereX[®] Wound Cleanser:

Spray, aplique ou despeje na área lesada. Quando usado em feridas, o BerbereX[®] Wound Cleanser pode ser aplicado na área afetada como irrigação ou limpeza. Também é usado para molhar certos tipos de curativos (curativo úmido a úmido). Siga as instruções do seu médico exatamente.

O efeito antibacteriano da solução BerbereX[®] pode ser afetado por múltiplos fatores. Portanto, esta solução é frequentemente usada apenas uma vez por dia para feridas leves, uma ou duas vezes ao dia para feridas crônicas e duas vezes ao dia para feridas altamente drenantes ou contaminadas. Use este produto conforme indicado pelo seu médico.

Informe o seu médico se a sua condição não melhorar ou se piorar. Discuta outras opções de tratamento com o seu médico.

Instruções passo a passo para uso:

Antes de usar, por favor, leia todos os avisos no rótulo.

1. Usando uma técnica limpa, aplique o BerbereX[®] Wound Cleanser na área afetada.
2. Para limpar, use o bocal de pulverização para saturar a ferida.
3. Para irrigar, ajuste a distância do bocal à ferida, de modo que a névoa cubra toda a superfície da ferida.
4. local pode ser coberto com uma bandagem limpa ou estéril. Se enfaixado, deixe secar primeiro.
5. Mantenha o bico de pulverização fechado quando não estiver em uso. Siga as instruções no rótulo.

CLINICAL USE:

Siga as diretrizes da instituição / instituição para controle de infecção

Dosagem e Administração:

1. Use o BerbereX® Wound Cleanser 1-2 vezes por dia ou quantas vezes forem necessárias as bandagens. Pulverize na área afetada até a saturação, drene a ferida e sature-a novamente. Deixe a solução irrigar a ferida por 2-3 minutos e prossiga para curativo.
2. Sob protocolo rigoroso de controle de infecção: Use o BerbereX® Wound Cleanser como um curativo úmido. Aplique-o à gaze e embale-o com pensos saturados por 2 a 3 minutos, uma ou duas vezes ao dia. Remova o curativo embalado. Proceda com o procedimento de tratamento de feridas prescrito pelo médico e aplique um penso limpo.

Ao tratar úlceras diabéticas, varicosas ou de pressão, juntamente com o BerbereX® Wound Cleanser, use outros meios fisioterapêuticos e atividades físicas (bandagem elástica, aparelhos ortopédicos, bem como outros meios para melhorar a circulação periférica). Os efeitos da aplicação são manifestados na primeira semana. Em pacientes com diabetes, o efeito ocorre durante a segunda semana de uso.

Quando descontinuar o uso do BerbereX® Wound Cleanser:

1. Se o paciente tiver uma reação alérgica
2. Se o médico não observar sinais de melhora em duas semanas
3. Se a condição piorar